









Krankheitstolerante Hauptsorten

Sorte	Reifezeit (Epoche) ¹	Wuchs ¹	Ertrag ¹	Anfälligkeit: Krankheiten, Schädlinge, Mangelerscheinungen, Physiologische Störungen	Bevorzugte Lagen und weitere Bemerkungen	Wein, Typ und Charakter
Bronner 	1. E spät	++	++	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Mehltau: tolerant Echter Mehltau: mittel bis anfällig Graufäule: mittel bis anfällig Mg-Mangel: anfällig 	<ul style="list-style-type: none"> Ertragsbegrenzung nötig Gute Traubenreife wichtig 	<ul style="list-style-type: none"> Lebendig Neutral Bitterkeit und Astringenz im Abgang
Johanniter 	1. E früh	∅	++	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Mehltau: tolerant bis mittel Echter Mehltau: tolerant Graufäule: mittel bis anfällig 	<ul style="list-style-type: none"> Ertragsbegrenzung nötig 	<ul style="list-style-type: none"> Neutral bis fruchtig Mittlere Struktur Manchmal Bitterkeit im Abgang
Seyval blanc 	1. E früh	∅	+++	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Mehltau: tolerant Echter Mehltau: ziemlich tolerant Graufäule: anfällig Vögel und Wespen: anfällig 	<ul style="list-style-type: none"> Ertragsbegrenzung nötig 	<ul style="list-style-type: none"> Neutral bis leicht fruchtig Leichte Zitrusnote Auch für Schaumwein
Solaris 	Sehr früh	++	++ V/K	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Mehltau: tolerant Echter Mehltau: mittel tolerant Graufäule: mittel bis anfällig Vögel und Wespen: anfällig 		<ul style="list-style-type: none"> Gehaltvoll Trockene Weine Angenehm fruchtig Mittlere Finesse Süssweine Komplexe Aromatik und Struktur
Cabernet Jura 	1. E	++	++ V/K	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Mehltau: tolerant Echter Mehltau: mittel bis tolerant Graufäule: tolerant 		<ul style="list-style-type: none"> Tiefe Farbe Florale Aromatik (Rosen, Litchi) Gute Tanninstruktur
Regent 	Früh	++	∅ V/K	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Mehltau: tolerant Echter Mehltau: ziemlich tolerant Graufäule: mittel tolerant Mg-Mangel: anfällig Vögel und Wespen: anfällig Grüne Beeren: anfällig 	<ul style="list-style-type: none"> Frühlagen meiden Unverträglichkeit mit 3309 möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Tiefrote Farbe Kräftig Samtige, manchmal rauhe Gerbstoffe Rose- und Rotweine

Bemerkungen (siehe Rückseite)

¹ Siehe nähere Angaben und Abkürzungen: Legende Datenblatt 1.40



Bemerkungen

- Krankheitstolerante Sorten sind mehr oder weniger tolerant gegenüber Falschem Mehltau, Echtem Mehltau und Graufäule. Gegen Schwarzflecken, Rotbrenner und Schwarzfäule sind diese Sorten nach wie vor anfällig. Ein minimaler Pflanzenschutz (ca. drei Behandlungen) wird empfohlen.
- Neue interspezifische Sorten werden laufend gezüchtet. Diese dürfen nur mit dem Einverständnis des Sorteninhabers vermehrt werden.

Legende

Reifezeitpunkt		Wuchs	Ertragspotenzial
Früh	> 5 Tage vor Chasselas	Sehr stark	+++
1. Epoche	1. E +/- 5 Tage im Vergleich mit Chasselas	Stark	++
2. Epoche	2. E 10 bis 20 Tage nach Chasselas	Eher stark	+
3. Epoche	3. E 20 bis 30 Tage nach Chasselas	Mittel	Ø
		Eher schwach	-
		Schwach	--
		Sehr schwach	---
		V	Verrieseln
		K	Kleinbeerigkeit